



الحاكمة كاثيري هوكول

لننشر فوراً: 2024/8/30

الحاكمة هوكول تشجع سكان نيويورك على حماية أنفسهم من فيروس غرب النيل والأمراض الأخرى التي ينقلها البعوض قبل عطلة عيد العمال

تشجيع سكان نيويورك على اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من لدغات البعوض

تم الإبلاغ عن عشرين حالة إصابة بفيروس غرب النيل هذا العام على مستوى الولاية

تأكيد إصابة الخيول بفيروس التهاب الدماغ الخيلي الشرقي في عدة مقاطعات في ولاية نيويورك

شاهد رسالة الحاكمة هوكول إلى سكان نيويورك

ذُكرت الحاكمة كاثيري هوكول اليوم سكان نيويورك بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من لدغات البعوض والحماية من الأمراض مثل فيروس غرب النيل والتهاب الدماغ الخيلي الشرقي. كما نشرت الحاكمة فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن نصائح إضافية للسلامة وحثت سكان نيويورك على مواصلة نشر التوعية. [شاهد الفيديو بالكامل](#) هنا.

"نريد من الناس أن يخرجوا في عطلة عيد العمال هذه ويستمتعوا بجمال ولاية نيويورك، لكننا نريدهم أن يفعلوا ذلك بأمان مع وضع صحتهم في الاعتبار من خلال اتخاذ الخطوات المناسبة للحماية من البعوض الذي يحمل أمراضًا مثل فيروس غرب النيل،" قالت الحاكمة هوكول. "تظل الوقاية هي الطريقة الأكثر فعالية للحماية من التعرض للأمراض التي ينقلها البعوض ويمكن أن تكون بسيطة مثل حماية بشرتك المكشوفة بالملابس واستخدام طارد البعوض."

توجد حاليًا 10 حالات إصابة بشرية بفيروس غرب النيل (West Nile virus, WNV) خارج مدينة نيويورك، وفقًا لإدارة الصحة في ولاية نيويورك ([New York State Department of Health](#)). كما تم الإبلاغ عن 10 حالات إصابة بشرية في مدينة نيويورك، وفقًا لقسم الصحة والنظافة العقلية في مدينة نيويورك ([New York City Department of Health and Mental Hygiene](#)).

قال الدكتور جيمس ماكدونالد، مفوض الصحة في ولاية نيويورك (New York State Health)

(Commissioner): "على الرغم من أن لدغات البعوض تُعتبر غالبًا من الأمور المزعجة الصغيرة في الحياة، إلا أننا نشهد هذا العام ظهور المزيد من البعوض الحامل للأمراض أكثر من المعتاد. إن ارتداء طارد الحشرات وإزالة المياه الراكدة وارتداء الملابس المناسبة يساعد على تقليل المخاطر. سيظل البعوض موجودًا في مجتمعاتنا حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول على الأقل، لذا من المهم أن ننتبه إلى كيفية حماية أنفسنا عند قضاء الوقت في الهواء الطلق."

فيروس غرب النيل، وهو عدوى يمكن أن تسبب مرضًا خطيرًا، وفي بعض الحالات الموت، ينتقل إلى البشر وبعض الحيوانات من خلال لدغة البعوض المصاب. لا يحمل جميع البعوض فيروس غرب النيل (WNV)، الذي تم اكتشافه لأول مرة في ولاية نيويورك في عام 1999. منذ عام 2020، تم الإبلاغ عن 115 حالة إصابة بشرية بفيروس غرب النيل (WNV) وثمانين وفيات في ولاية نيويورك، باستثناء مدينة نيويورك.

لا تظهر أي علامات أو أعراض على معظم الأشخاص المصابين بفيروس غرب النيل (WNV). في حالة الإصابة بالمرض، تظهر الأعراض عادةً بعد ثلاثة أيام إلى 15 يومًا من لدغة البعوضة المصابة. وقد يصاب الأشخاص الذين يعانون من حالات خفيفة من فيروس غرب النيل (WNV) بالحمى والصداع وآلام في الجسم وأحيانًا طفح جلدي أو تورم الغدد. وقد يعاني الأشخاص المصابون بفيروس غرب النيل (WNV) الشديد من ظهور مفاجئ للصداع وارتفاع في درجة الحرارة وتيبس في الرقبة وضعف في العضلات وتغير في الحالة العقلية ورعشة وتشنجات و/أو شلل، وفي بعض الحالات، قد يؤدي فيروس غرب النيل (WNV) الشديد إلى الوفاة.

التهاب الدماغ الخيلي الشرقي (Eastern equine encephalitis, EEE) هو مرض فيروسي نادر ولكنه خطير للغاية ينتشر عن طريق البعوض ويمكن أن يؤثر على البشر والخيول. على الرغم من وجود 14 حصانًا ثبتت إصابتهم بالفيروس في ولاية نيويورك هذا الصيف، إلا أنه [لا توجد حاليًا أي حالات بشرية تم الإبلاغ عنها في ولاية نيويورك](#).

الأشخاص من جميع الأعمار معرضون للإصابة بالعدوى، ولكن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا وأصغر من 15 عامًا هم الأكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة. بينما لا تظهر أي أعراض على معظم الأشخاص الذين يُلدغون بالبعوض، إلا أن الحالات الشديدة قد تبدأ بظهور مفاجئ للصداع، والحمى العالية، والقشعريرة، والتقيؤ. وقد يتطور المرض بعد ذلك إلى التوهان والنوبات والتهاب الدماغ والغيبوبة. يموت ما يقرب من ثلث المرضى الذين يصابون بالتهاب الدماغ الخيلي الشرقي (EEE)، بينما يعاني العديد من المرضى الذين ينجون من التهاب الدماغ الخيلي الشرقي (EEE) من ضعف عصبي.

لا يوجد لقاح متاح تجاريًا للبشر ضد التهاب الدماغ الخيلي الشرقي (EEE) أو فيروس غرب النيل (WNV)، وأفضل وسيلة للحماية هي تجنب لدغات البعوض.

يُوصى بشدة باتباع الاحتياطات التالية لتقليل خطر الإصابة بعدوى فيروس غرب النيل (WNV) والتهاب الدماغ الخيلي الشرقي (EEE):

- ارتد أكمًا طويلًا عندما تكون في الهواء الطلق، خاصةً عند الغسق أو الفجر، وهي الأوقات التي يكون فيها البعوض أكثر نشاطًا.
- استخدم طارد الحشرات الذي يحتوي على مادة ديت (DEET) أو بيكاربيدين أو IR3535، وضعه فوق واقي الشمس. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول المواد الطاردة للحشرات [هنا](#). تأكد من اتباع إرشادات ملصق طارد الحشرات. يجب ألا يتعامل الأطفال مع المواد الطاردة للحشرات مباشرة. وبدلاً من ذلك، يجب على البالغين وضع المواد الطاردة للحشرات على أيديهم أولاً ثم دهنها برفق على جلد الطفل المكشوف. تجنب وضعه مباشرة على أيدي الأطفال. بعد العودة إلى الداخل في المنزل، اغسل جلد طفلك المُعالج وملابسه بالصابون والماء، أو حمّمْ الطفل. يمكن حماية الحيوانات الأليفة باستخدام مبيد الحشرات المصمم خصيصًا للحيوانات.
- تأكد من وجود ستائر منخلية على نوافذ وأبواب المنازل. تأكد من أن الستائر خالية من الشقوق والتمزقات والثقوب.
- أفرغ الماء من الدلاء والحاويات الأخرى وأغطية أحواض السباحة والأواني الخزفية وعربات اليد.
- أفرغ برك السباحة الضحلة عندما لا تكون قيد الاستخدام.
- قم بفك انسداد المصارف والمزاريب للسماح بتصريف المياه.
- قم بتغيير الماء في أحواض استحمام الطيور كل يومين.

من المحتمل أن يتعرض المسافرون لخطر الإصابة بأمراض مثل حمى الضنك والملاريا. هناك حاليًا خطر متزايد من انتقال فيروس حمى الضنك في الولايات المتحدة.

حمى الضنك هو مرض تسببه لدغة بعوضة مصابة بأي من فيروسات حمى الضنك الأربعة المحددة. يمكن أن تسبب حمى الضنك حمى شديدة وصداعًا شديدًا وألمًا خلف العينين وألمًا في المفاصل وآلامًا في العضلات. ينتشر البعوض الذي يحمل هذا المرض بشكل رئيسي في المناطق الاستوائية، لذا قد يصل المسافرون إلى الولايات المتحدة وهم مصابون بحمى الضنك. على

الرغم من أن معظم الحالات التي تحدث في الولايات المتحدة ترتبط بالسفر إلى المناطق التي تتوطن فيها حمى الضنك، إلا أنه كانت هناك حالات انتشار عرضية لانتقال فيروس حمى الضنك محلياً، خاصة في الولايات الجنوبية.

الملاريا هو مرض خطير ومميت في بعض الأحيان ينجم عن لدغة بعوضة مصابة بأحد طفيليات الملاريا الدموية الأربعة. أنثى البعوض المصابة هي المسؤولة عن انتشار المرض البشري. تحدث معظم حالات العدوى في الولايات المتحدة نتيجة السفر إلى دول أجنبية، على الرغم من حدوث انتقال العدوى محلياً - خاصة في ولايات مثل فلوريدا وتكساس. في ولاية نيويورك، ترتبط جميع حالات الملاريا تقريباً بالسفر إلى الخارج، ومع ذلك، فقد حدثت حالات نادرة من انتقال الملاريا محلياً في لونغ آيلاند ومدينة نيويورك.

على الرغم من أن فيروس أوروبوش لا ينتقل في المقام الأول عن طريق لدغات البعوض، إلا أنه يشكل مصدر قلق لدى المسافرين العائدين إلى نيويورك من منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية. وينتقل الفيروس عن طريق لدغة حشرة البعوض ويمكن أن يسبب الحمى والصداع والقشعريرة وآلام العضلات والمفاصل. وغالباً ما يتم الخلط بينه وبين حمى الضنك. كما هو الحال مع فيروس غرب النيل، فإنه في بعض الحالات يمكن أن يسبب أعراض عصبية. هناك مخاوف من أن تؤدي عدوى أوروبوش لدى النساء الحوامل إلى نتائج سلبية للحمل. يجب على سكان نيويورك المسافرين إلى المناطق التي تتواجد فيها حمى الضنك والملاريا والأوروبوش والعائدين منها حماية أنفسهم من لدغات الحشرات باستخدام نفس تدابير الوقاية الموصى بها للحماية من فيروس غرب النيل (WNV) والتهاب الدماغ الخيلي الشرقي (EEE).

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول فيروس غرب النيل [هنا](#).

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول التهاب الدماغ الخيلي الشرقي [هنا](#).

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول حمى الضنك [هنا](#).

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول الملاريا [هنا](#).

يمكن العثور على مزيد من المعلومات عن فيروس أوروبوش [هنا](#).

###

تتوفر أخبار إضافية على www.governor.ny.gov

ولاية نيويورك | الغرفة التنفيذية | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

سجل للحصول على تحديثات من مكتب الحاكم: ny.gov/signup | أرسل NEW YORK في رسالة نصية إلى 81336

[إلغاء الاشتراك](#)