



Per la diffusione immediata: 15/10/2018 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

**IL GOVERNATORE CUOMO RICORDA AI NEWYORKESI DI VACCINARSI ORA
CHE SI STA AVVICINANDO LA STAGIONE DELL'INFLUENZA**

***Lancia la campagna pubblica di sensibilizzazione a livello statale esortando i
newyorkesi a farsi vaccinare***

***La legge dello stato di New York ora permette ai farmacisti di somministrare
vaccinazioni antinfluenzali a giovani tra i 2 e 18 anni***

[Qui](#) è disponibile materiale informativo visualizzabile e stampabile

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha ricordato a tutti i newyorkesi di farsi vaccinare durante l'imminente stagione influenzale, la quale generalmente comincia ad ottobre e continua fino a maggio. Durante la stagione influenzale dello scorso anno, a New York si sono verificate 23.377 ricoveri correlati all'influenza e 6 morti pediatriche. Nel corso degli ultimi quattro anni, nello Stato di New York si sono verificate un totale di 25 morti pediatriche causate dall'influenza.

“La vaccinazione rimane il miglior metodo per non ammalarsi durante questa stagione”, **ha dichiarato il Governatore Cuomo.** “Risulta fondamentale che tutti i newyorkesi, specialmente gli anziani, i bambini in tenera età e le donne incinte, vengano vaccinati il più presto possibile, ed è importante utilizzare le precauzioni necessarie a prevenire la diffusione del virus a New York.”

A gennaio 2018, il Governatore Cuomo ha firmato un [decreto esecutivo](#) d'emergenza, permettendo ai farmacisti di somministrare vaccini antinfluenzali, durante la stagione influenzale 2018, ai giovani di età compresa tra 2 e 18 anni. Successivamente alla firma del decreto esecutivo d'emergenza, i farmacisti hanno somministrato vaccini antinfluenzali ad approssimativamente 9.000 individui di età compresa tra 2 e 18 anni d'età. Susseguentemente, il Governatore ha approvato la legislazione codificando questo decreto esecutivo in legge. Il Governatore esorta i newyorkesi a utilizzare al meglio le varie opportunità per farsi vaccinare.

Durante questa settimana, è stata lanciata una campagna di sensibilizzazione pubblica a livello statale per ricordare nuovamente ai newyorkesi di farsi vaccinare. Il Dipartimento della salute (Department of Health), l'Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia (Office of Children and Family Services), l'Ufficio per gli anziani dello Stato

(State Office for the Aging) e il Dipartimento per l'educazione dello Stato (State Education Department) coordineranno le iniziative volte a rendere disponibili contenuti informativi in modo mirato alle persone più a rischio, queste includono bambini, donne incinta e anziani. In aggiunta, il Dipartimento della salute dello Stato sta mettendo a disposizione materiali informativi relativi all'influenza, questi possono essere stampati e pubblicati per aiutare ad aumentare la consapevolezza.

L'Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia sta rendendo disponibili materiali informativi relativi all'importanza del vaccino antinfluenzale, mettendoli a disposizione di tutti i fornitori di servizi infantili autorizzati a livello statale e a tutti i fornitori di servizi doposcuola finanziati dallo Stato. Come imposto dalla legge, tutti i programmi scolastici e di cura all'infanzia devono esporre in modo chiaro le informazioni inerenti alla vaccinazione.

Per ricevere un vaccino antinfluenzale, le persone dovrebbero contattare il proprio fornitore locale di servizi sanitari o farmacia, oppure trovare le informazioni inerenti alle cliniche che offrono le vaccinazioni contattando il proprio [dipartimento sanitario locale](#).

L'influenza può causare malattie gravi. I sintomi includono: febbre, tosse, mal di gola, naso che cola o intasato, dolori diffusi, mal di testa, brividi e affaticamento. Alcune persone potrebbero soffrire di conati di vomito e diarrea. Le persone infettate dall'influenza possono soffrire di sintomi legati alla respirazione anche senza la comparsa della febbre. Il CDC raccomanda che le persone molto malate o coloro che sono malati e ad alto rischio di serie complicazioni correlate all'influenza, prevenano la problematica utilizzando farmaci antivirali contro l'influenza. I farmaci antivirali funzionano meglio quando vengono assunti entro due giorni dalla comparsa dei primi sintomi. Al momento, non esiste una carenza di farmaci antivirali, i fornitori affermano di essere in grado di soddisfare la richiesta stagionale preventivata.

Adulti di 65 anni o più anziani, persone con certi problemi medici cronici, giovani bambini e donne incinta sono tra le persone a più alto rischio di complicazioni serie causate dall'influenza, questo potrebbe portare all'ospedalizzazione e potrebbe causarne la morte. Dato che il virus influenzale può diffondersi tramite tosse e starnuti, è particolarmente importante che i membri della famiglia e coloro che sono regolarmente in contatto con individui ad alto rischio siano vaccinati. Inoltre, tutti gli operatori sanitari dovrebbero essere vaccinati contro l'influenza per proteggere la loro salute e la salute dei loro pazienti.

Il Commissario del Dipartimento della salute dello Stato di New York, Dr. Howard Zucker, ha commentato: "La prevenzione rimane il metodo più efficace per evitare il diffondersi dell'influenza. Anche le persone sane, se non vaccinate, possono facilmente trasmettere il virus dell'influenza a membri della famiglia, amici o colleghi".

Il Direttore ad interim dell'Ufficio per gli anziani dello Stato di New York, Greg Olsen, ha dichiarato: "Risulta realmente importante che tutti i newyorkesi, specialmente gli anziani, vengano vaccinati contro l'influenza. Il sistema immunitario si indebolisce con l'invecchiamento, e gli anziani, specialmente coloro che soffrono di problematiche fisiche croniche, sono ad alto rischio di sviluppare gravi complicazioni

causate dall'influenza. Il vaccino antinfluenzale aiuta a prevenire la diffusione del virus e offre una protezione vitale per anziani e per chi si cura di loro”.

La Commissaria f.f. per l'Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia, Sheila J. Poole, ha commentato: “È tragico apprendere di morti infantili causate da una malattia prevenibile come l'influenza. I genitori dovrebbero vaccinare i bambini in età adatta a ricevere la vaccinazione, lo stesso vale per chiunque si prenda cura dei bambini o entri in contatto con loro”.

In aggiunta a farsi vaccinare, è importante mantenere una buona igiene delle mani:

- Lavare spesso le mani con sapone e acqua calda per almeno 20 secondi in modo da proteggersi dai germi ed evitare la loro trasmissione ad altri.
- Portare con sé un disinfettante per le mani a base di alcol da utilizzare quando sapone e acqua non sono disponibili. Scegliere un prodotto contenente almeno il 60 per cento di alcol.
- Non coprirsi con le mani quando si tossisce o starnutisce. Al contrario, coprire bocca e naso usando un fazzoletto, successivamente buttarlo nella spazzatura e lavare le mani.
- Evitare di toccarsi gli occhi, il naso o la bocca.
- Evitare il contatto ravvicinato con persone malate, e in caso di insorgenza di malattia limitare il contatto con gli altri.
- Pulire e disinfettare le superfici che potrebbero essere contaminate dal virus influenzale.

Per ulteriori informazioni sull'influenza, compreso il monitoraggio nello Stato di New York, visitare il sito web

<http://www.health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal/>.

###

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

[ANNULLARE L'ISCRIZIONE](#)